

De Cancri Proxima Causâ.
Dissertatio;

Quam Petrus Antonius Perenotus,
In Regia Taurinensi Academia
Collegii Chirurgici Socius,

Præstantissimis Viris,
Regiæ Parisiorum Academia Chirurgica
Sociis,
D. D. D.



De Canticis & Proverbia Cantus

Dialecticis

Quamvis & Canticis & Proverbia

De Regis & Tamen & Canticis

Collegii & Canticis & Proverbia

De Regis & Tamen & Canticis

De Regis & Tamen & Canticis

De Regis & Tamen & Canticis

De Regis & Tamen & Canticis

Quamquam a peritis Chirurgia Cultoribus Cancer quandoque sanetur, quod amputationis ope ut plurimum fieri apud Chirurgeos intelligo; ipsum tamen, quotiescunque amputatio inhibetur, aut ipse post ablationem renascitur, fere nullam reciperare curationem, experientia huc usque comprobavit.

At, undenam hoc, nisi ex eo quod ignoretur ejus proxima Causa? Quis enim, inexpugnata Causa, poterit effectus removere?

De hac aliquot extant cum Veterum, tum Recentiorum quorundam sententiae, quae quidem omnes eo tendere videntur, ut patefaciant pravam Canceri indolem: attamen, quum per eas nondum perventum sit ad illa evolvenda de Cancero phaenomena, quae et Arti lumen adjicere, et Artem ad summum attingendum scopum ducere, si recte intelligerentur, valerent, impedimento non erunt nobis, quominus proximam Canceri Causam, investigatu quidem difficillimam, ulterius inquiramus.

Hoc plane consilio, nempe ut opus hoc arduum, ac perdifficile veritatis amore adgrederer, in hanc Florentissimam Etademiā eo libentius accessi, quò vestra omnium sum certior humanitatis, per quam, siquid boni dixerō, gratus ero; sin futilia, et inania protulerō, veniam obtinebo, neque nimis inuas audacia notā.

S. 1. Duplex in Cancro venenum existere, putrefaciens scilicet, atque corrosivum, pronuntiavit Hilidanus. Idipsum confirmavit Emullerus, addendo praeterea: hoc esse acidum volatile, insigniter corrosivum, de natura quasi arsenicali (a). Junckerus non amplius venenum, sed corruptionem corrosivam, et putredinosam, quam modo seroso-lymphaticam, modo sphaceloso-ulcerosam, seu putredinoso-salinam appellitat, in Cancro considerat (b).

Alii, nonnisi acere canerosum sit acidum, vel alcali, diligentius perquirunt; nonnulli, ut propius accedant Veritati, sales acidos, alcalicos, volatiles, aut fixos, muriaticos, vitriolum, sulphur, terram, et sexcenta alia congerunt, aquam stygiam animo effingunt, et hanc ponunt in Cancro pro illius proxima Causa. Alii denique oculis lymphaticis observant vermiculos in Cancro stabulari, hosque cum ejus ortu, tum incrementi causam esse statuunt.

S. 2. Has porro vulgatissimas Opiniones, si postremam tamen

(a) Chirurgia
Medica Cap. 2.
Artic. III.
membr. 20.

(b) V. Conspect.
Chirurgiae.
Tab. X. et II.



excipiamus, a nobis penitus rejelli prudentia non patitur, quum vere adsit in Cancro et corruptio, quae ex tristi, intolerabilique tumorescit maphiti, et aliqualis rodendi vis, prout aeris dolor punctorius et carnis, atque velaminum plaga demonstrant, sive alcalicis, sive acidis, sive aliis quibuscunque, quod nunc non interest discutere, speculativis haec vis corrosiva sit tribuenda. Verum, ut ingenue loquar, neque eis acquiescendum esse ratio suadet, quod exinde integra erui non possit quorundam phaenomenorum in Cancro contingentium explicatio, quae multum Therapeja facessunt negotii, atque medicaminum vim eludere constantiter solent, ac irritam reddere.

§. 3. Enim vero, admissis quantumlibet in Cancro putrefactione, et vi corrosiva, quomodo in Cancro incipiente, qui, nisi Struma, Scirrhus, aut Lupia praecesserit, ciceris, aut fabae magnitudinem non superat, duritiem, inaequalitatem, colorem cutis naturalem, atque incrementum inde explicabimus, quin potius, a doloris praesentia, et qualitate moniti, dicamus illum prout apertum vi, quam incrementum cepit? At respondet aliquis: in hoc stadio adhuc tanta non est putrefactio, et rodendi vis, ut ulla sequi debeat Canceri apertio. Transcamus igitur ad alterum stadium, et Cancrum saevientem observemus.

§. 4. Sensim durum illud tuberculum increvit modo citius, modo tardius, et mirandam quandoque acquirit molem. Durities, asperitas, et dolor, qui punctorius est (§. 2), augmentur; calor in parte auctus subsequitur, cutis naturalis color in atro-rubentem, plumbeum, vel nigrum mutatur, ac venae damnum atro sanguine turgent, lividae apparent, atque fluvialis Canceri pedum adinstar nodosa circumquaque fiunt, quod Canceri nomen huic morbo impertitur. Tunc Cancer ad exemplum suam pervenisse videtur: attamen dum cutis adhuc manet integra, uti apud Graecos καρκίνος απύκτωνος, sic a nobis occultus Cancer dicendus est.

§. 5. In hoc stadio, nisi dolorem a corrodendi potentia, et cutis, venarumque fortasse livorem velimus a putrefacto sanguine repetere, nullam ulterius invenio duritiei, inaequalitatis, et tanti incrementi rationem, neque rationem intelligo, cur Cancrum, hisce omnibus stipatum caracteribus, tot annorum

spatio, illarum integumentis interdum gestari, uti observatione satis
comperitum est, putrefactio, et corrosio patiantur. Adverso tamen
dupliis huiusce vitii effectus fore patentiores, quum Cancer ad ter-
tium pervenerit stadium; quando non ulcus occultum, sed manifestum
Cancer est. Tunc etenim ulcus adest crassum, malignum, horren-
dum, foetidum, atque summoque foetens, cum virulenti humoris
effluxu, et haemorrhagia: quod ulcus ab auctoribus aut simpliciter
Cancerum, aut Lupus, vel Phagadana passim nuncupatur.

S. 6. Qui vero factum intelligamus, ut ulceris huiusce labra
perpetuo sint praeputrida, dura, vesovida, et inaequalia? Cur non
potius credamus partes molles a Cancro obsepsas, putrefactione,
et corrosione intervenientibus, opium tenus consumi, ac destrui
debere, uti pro sola corruptione in sphacelo contingere videmus?
Cum salibus exsiccatis, ut ajunt aliqui, debetur hoc phaenomenon?
Hacine est salium in corpore humano proprietates, ut e statu
fluiditatis, aut fusionis ad siccitatem, ut ita dicam, transcant,
atque inertes evadant? Inertes dico, nam, si vim exerant suam, salium
acidorum spiculis, et polygonis aliorum figurarum omnes fibras in Cancro exis-
tentes corroderent, oportet, et tandem resolvantur ita, ut nullam am-
plius possimus in eo supponere accretionem, quin totum ipsum ex
salibus, aut ex eorum cum terra, et sulphuris modico mixtione con-
cretum absurde credamus. Tum quomodo concipiemus, ubi semel
consumta fuerunt vasculares fibrae, eadem ex confuso, nimis, atque
praeternaturali salium, terra, et aliis generis rerum adventu re-
nasci posse tales, ut humorem contineant, qualis est sanguis, qui e
vasculorum patulis orificiis conuulgit, quoties Cancro superficies fricatur?

S. 7. Quidquid tandem de huiusmodi salibus praedicent nonnulli
eximia doctrina Viri, ex adverso pugnat Clariss. Joannes —
De-Horter, inquit: „Qui omne acere corrodens deducunt ex acido, vel
„alkali, hoc quoque conati sunt demonstrare in Cancro: sed quoniam
„non extinguitur, aut mitigatur acere cancerorum applicatione acidi, (c) V. Chirurg.
„vel alkali, neque cum his effervesceat, satis patet eam sententiam Reppugantem
„ex inani hypothese esse deductam (c). Lib. XI. Cap. VI.

S. 8. Quod de aliis opinionibus hactenus dixi, id ipsum, nequid-
in hac sententiarum disquisitione praeterire videar, dicam de verni-
culis. Isti nimirum gratis in Cancro admitti mihi videntur, quod
animacula ista mercurio, aut cuiusvis rodentis applicatione necari,
et contra istiusmodi rebus Cancrum exasperari audio.



Exatque quicquid, si existerent in Cancro audaces isti humani generis hostes, utpote qui ex hypothesi eximium videntur afferunt dolorem, et Cancrum ad ultimum perducunt, carnem ubicunque depascendo, ejus impedirent mori-
bosam excrecentiam.

Sed hæc tandem missa faciamus, et Veterum simplicitatem se-
quentes, qui quaternarium humorum numerum in humano corpore
statuebant, ex eorum alterutro plerorumque morborum originem qua-
ritantes, videamus, ratione duce, et experientia, quidnam sit humor
in Cancro prædominans, ut ipsius cognita, ac perspecta natura,
ejus in posterum corrigendæ methodus certa excogitetur.

§. 9. Ad hunc scopum consideranda potissimum sunt morbosæ
sanguinis, sari, et lymphæ mutationes, ut si qua ex iis hinc morbo
congruat, ea pro illius causa adoptetur; sin contra, causam aliunde
petamus. Jam vero sanguis in propriis vasis redundans, et in vasa
lymphatica irruens, inflammationem parit, atque in lentorem
compingitur: quæ inflammatio, si nullatenus resolvatur, vel san-
guine in pus mutato convertitur in abscessum, brevi sanandum
foras ejecta materia in ejus cavo contenta, vel scirrupsam acqui-
rit duritiem, quæ laxantibus, et resolventibus, simul adhibitis
modo solvitur, modo tendit in suppurationem; vel tandem in
corruptionem abit, tunc vero, neglectis iis, quæ gangrenam sistere,
et sphacelum præpedire valeant, brevi mora corrumpunt partes,
quibus inest corruptio, labefactantur, putrescunt, succidunt.

Ipse sanguis extra vasa ejectus, et in aliquo ventre copiose
coactus, ut in Empyemate, vel parcius congestus, ut in Echyinesi,
quoquomodo in pus, aut sanie mutetur, nunquam tantam
præsefert acrimoniam, qualem in vero Cancro observamus.

Unde patet sanguinem in causa non esse, cui Cancer saviat
in corpore humano, ac tandem partes affectas exuviet.

§. 10. Serum, et lympham convescere posse, cum membrana
qua inter pulmonem, et pleuram præter naturam invenitur,
horum cohesionem facientes; tum intestinorum cum hernioso
sacco adhesio, qualem in Kelotomia instituenda identidem obser-
vant Chirurghi; tum osciula inter arteriarum tunicas reperi-
ta ut egomet ipse in aorta descendens, et cæliaca tunica, atque
in arteria emulgente sinistra, Vetula cadaver anatomice spe-
culans, vidi, tum denique ipsa lymphæ alibilis usus aperte
declarant. Veruntamen hinc liquores isti producendis Cancro
phenomenis imparos videntur: Nemo enim ipsos, utpote

magnam habentes adjunctam aqua copiam, acrimoniam adipisci conu-
sam satis probaverit. Quoniam igitur in liquore Cancro seminum
latere credendum est?

An hoc in corporis nostri pinguedine, quam ceteroquin acrimonie
temperanda aptam esse consentiunt. Cluctores, invenire sperabimus?
Ita plana. Hanc equidem ipse fero sententiam. Hanc jam laudato
Joanni Hortero acceptam refero. Hanc ratiocinio tueri, observatio-
ne, et experientia illustrare pro viribus meis conabor.

S. 11. Ne enim vera, nonne muliebres mammae, quarum glan-
dulae multa circumdantur pinguedine, Cancro frequentius labo-
rant, quam ceterae partes? Porro, si quis adipem crederet hic a natura
uberius coacervari ad muliebres pectoris tantummodo ornamentum
Naturam futilibus intentam videret, cuius sapiens consilium ad
plura vitae commoda semper collimat. Adeps hinc multa adstruitur,
fortasse ut aliqua ejus portio, lactiferos ductus permeans, lacti im-
miscatur (quod tamen affirmare non audeo), aut, quod certum est,
ut pulvillo sit glandulis contra ictus externos, et illarum vasa,
et involucria servet perpetuo flexibilia. Igitur, quum mammarium
glandula Cancro facilius corripiantur post aliquam contusionem,
satius erit credere, quod Cancer ibi ex adipis stagnatione fiat, quam
laboratorium chemicum illico in glandula imaginari, atque
Chemicum munus Naturae adjungere, ut materiam conficiendo
Cancro necessariam pararet, et animalis evertat oeconomiam.
Ne haec dicentem aliquis forte incensabit impudentia, sed ipsum
vogo, sequentia mecum recogitet, sentieturque diligenter.

S. 12. Nonne illa Cancro corripitur solent organa, quae ex infinito
eiusque generis vasorum numero, et inextricabili textura compo-
nuntur, glandulas juxta conglomeratas, et conglobatas, uterum,
hepar, et similia, in quibus, tamquam in labyrintho, detinetur, im-
plicatur, ac irretitur humor lentescens, congestionem factururus?
Quid vero ibi citius, faciliusque stagnabit pinguedine, quae ex
consideratione particularum, quae in ipsa, uti loquuntur Physici,
extant ramosae, hamatae, uncinatae, validam inter se cohae-
sionem servant, omnium lentescentium humorum lentif-
sima suapte natura apparet.

Nonne facies, quae aëris contactui assidue observatur, saepius
infectatur Cancro? Quid vero in ejus superficie frigoris noxam
magis suscipiet, quam humor sebaceus in cypsis collectus,



qui non excernatur, sed potius in folliculo concreset, et subsidebit?
 §. 13. Huc accedit, quod in partibus cancro obsessis adiposum panniculum non modo supra ipsum cancerum, sed ad magnam ejus distantiam pariter tumefieri experientia constat. In corporibus cancro laborantibus opera interdum nulla vi frangi, aut contra turgescere, et amoliri visa sunt. Et pinguium remedium applicatione cancro habetur incrementum, quae remedia indis opibus applicata, vel vaniorum propter calorem partis suscipiendo, vel medullae olei exhalationem prohibendo, cariem produciunt, vel productam augent.

Dolor in cancro sub solis occasum, nocturnus exacerbatur, perinde ac dolor osteocopus in spina ventosa, et syphilide, morbis ex vitiosa pinguedine oriundis (d). Haec omnia, et alia, quae nunc praeterea alibi

(d) Vide Joan. de Fortes Chirurg. Rapor. lib. II. cap. II. et Herman. Boerhaav. aphor. de morbo. et Tractatum de hunc aphrod.

fortasse dicturus, sententia mea singulariter favere nemo non videt. Sed nihilominus prosperam dicta sunt, ac temere excogitata, nisi in corporibus cancro maxima obnoxii, nimirum in sedentariis, plethoricis, melancholicis, et senibus pinguedinem insigniter vitari demonstraverit.

§. 14. Verum, ne ulla res me deinceps a suscepto argumento detorqueat, hic monebo, quamquam vos certe non latet, quod oleum, et pinguedinem humani corporis naturalem suam temperiem aliquando amittere, tenuitatem induere, et corrumpi tam verum est, ut magnus Boerhaavius in hunc virum venerum scabulari crediderit, atque ex iis omnia huius aphrodisiacae mala proficisci (e).

(e) Tractat. de hunc aphrod.

Plura hunc tantum Virum in hanc opinionem adduxerant; Ego autem, si a proposito meo aliquandiu abstinere me licet, observationem vobis offeram, quae rei veritatem cominus probet, ac demonstrat.

§. 15. Adolescentis quidam, civis Taurinensis, bono fruens habitu, juvis utriusque doctor, et familiaris meus juvenidissimus, incerta mense et loco domi mea me adit, ut de morbo consulere sibi nuper oborto. Penem protulit, glandem detexit, et quatuor, aut quinque superficiales maculas nigras, prope ejus coronam versantes, oculis meis subiecit. Fatebatur sponte se duos ante dies in Veneris castris bis strenue pugnasse cum muliere, de cujus sanitate nihil suspicabatur antea: sed paullo ante suspicionis occasionem se nactum fuisse, quum Equitem Veneria infectum labe cum ipsa rem habuisse intellexerit. Ut huius morbo ut ut levi consulerem, et alium majorem praepedirem, decoctionem Guaiaci, et salsa perilla praescripsi, ad libras duas quaque die quindecim dierum spatio bibendam, cum vini albi, et mellis rosacei mixturem, qua saepius glandem tepide allueret, ac facilem

aptamque dietam commendari. Hæc rite executurus abiit adolescens, sed diebus vix septem elapsis, ad me rediit, remque mihi præbuit videndam, quam fortasse nemo hactenus observaverit.

Inter penem, et scrotum pona rapheæ extabat durum tuberculum, avellaneæ magnitudinem æquans, mediocri pungentia colore stipatum. E scroti autem superficie sudoris adinstar manabant guttulae humoris oleosi, crassiusculi, et graveolentis, qui non secus circumposita lintecula, et indusium tingebat, ac faceret olivarum corruptum oleum, quive molesto illum, et acri afficiebat pruritu.

Tuberculum illud, et hanc præternaturalem exsudationem eximia titillationi, quam in urethra senserat, successisse ager lubens vetulit: unde imminantem gonorrhoeam aliquam hoc iter extra moram suscepisse non immerito judicari posset. Quidquid tamen sit, nihil ulterius agro faciendum jussi, nisi ut jam præscriptam victus rationem, et bibendi methodum prosequeretur, atque ipsam decoctione tepida foveret prudenda. Hisce diligenter peractis, novemdecim dierum spatio convalescit magno scroti pilorum dispendio, qui omnes paulatim deciderant; ejusque facies, quæ aliquantulum expalluerat, speciosum denuo induebat colorem.

§. 16. Historiam hanc planè singularem tantis Viris me obiter enarrasse sufficiat, quin, quæ inde copiosè flunt argumenta perspicam. Hæc iudicio vestro emenda malo relinquere.

Interea progrediar ad perscrutanda generalia primum, deinde particularia pinguedinis phenomena, quorum facta cum his, quæ de Cancro accidunt, collatione, vehementer fore confido, ut aluescat: Pinguedinem acrem, tenacem, et corruptam esse veram Canceri materialem causam.

§. 17. Sanius homo, qui bene est a Natura comparatus, et dietam rite observat, parum adeo corporis habitum mutat, quoad obestatem, ut in eodem semper statu illum perseverare dixeris.

Quamobrem non temerè arbitrabor oleosam in ipso materiem sive pinguedinem eadem proportionem, quæ ab arteriarum minimis extremitatibus in panniculi adiposi, peritonæi, aliarumque partium cellulis seceratur, et colligitur, inde propter successum novæ pinguedinis adventum iterum, et jugiter exire, ut pro suo munere ad omnes partes solidas feratur, has penetret, irrigetque, ad flexibilitatem ipsis conciliandam, ad largiendam iisdem ad motum promptitudinem, adque præcavendos ipsarum accitus.

Sic ossa nullo magis abundant humore, quam oleo medullari.



Sic, quæ insignes motus edunt, et in girum aguntur membra, ossibus compinguntur cylindricis medullâ refertioribus. Sic eorundem membrorum musculis immensa interponitur, et superjacet, uti potissimum observare est in clunibus, vesicularum adiposarum congeries. Sic ipsum etiam cor, cujus fibrae in perpetua versantur oscillatione, non parva donatur pinguedinis quantitate.

§. 18. Porro illi, quæ ad Diatam pertinent, non rite comparatis, aliter evenit humano corpori. Etenim, quemadmodum fervidiore coelo, victu tenui, vigiliis, exercitationibus, et reliquis similibus impeditur magna pinguedinis coarctatio, atque ab eadem, quando excedunt, macies producitur: sic aere frigida, opiparo victu, somno protracto, et sedentaria vitâ ejus copia magnopere augetur, et consistentia.

Strophilorum sanè vicissitudinum ratio non est alimda petenda, quam vel ex actuali pinguedinis inopiâ in massa sanguinea, vel ex illius, in propriis receptaculis collectæ, nimia evacuatione, ac deperditione: aut contrario modo, ex ipsius actuali excessu in tota sanguinis massa, vel ex ejus inertia, seu nimium protractâ in propriis cellulis morâ. Ceterum, videamus quomodo hæc omnia ex dictis rebus pendeant, sed præmittamus, ut rei ordo requirit.

Pinguedinem suo functam officio a venularum quaquaversum hiantium oculis resumi, et unâ cum sanguine debere ad circuitum reveli majori sui parte, dum tamen illius portio aliqua, prout generalis humorum analogia monet, a corpore debet secedere.

§. 20. Itaque, quum ad restaurandum in solidis, fluidisque partium defectum animalis machina cibum pro præsentis semper postulet egestate, si victus tenuis est, parum hæc comparatur pinguedinis. Etatum enim majori intenta operi ex eo id perficit, quod Machinam tutius sustentet, et functionibus maximè necessariis exercendis idoneam faciat. Propter calidiorem aërem vero liquecit pinguedo, varescit, promptiorque fit consequenter cum ad evolvendum extra corpus (§. 19), quemadmodum humor sebaceus a vasis in cutis superficie sitis emanans (§. 12), et oleosa nubeacula aqua supernatans, in qua manus sudore madentes æstate lavamus, innuere videntur, tum ad solidas partes irrorandas, præcipuè si opus adest, veluti in exercitatione, et vigiliâ, quando partes solide in actione perseverantes id necessario requirunt, quod ipsarum potest motum adjuvare (§. 17). Hinc Rusticorum, et Fabri, qui gravibus, longis, continuisque fatigant membra laboribus, nullam nancisci videntur obesitatem. Hinc post frequentem,

violentas, et longas animalis cursitationes, aut propter alius generis fatigationes, tum propter inedia[m] vel o[mn]ia ipsa oleo inedul-
lari destituntur.

§. 21. En inde ratio sufficiens defectus, aut saltem consumptionis adiposae substantiae. Hisce viceversa dictis, ratio innotesceat ipsius abundantiae: sed in hac examinanda lubet aliquantisper immorari, et quaedam animadvertere, quae meae quammaximè suffragentur sententiae.

§. 22. Quamplurima, quae aetivo tempore emaciantur corpora, hyeme obesiore fieri, nemo ignorat. Si a frigore poros cutaneos dixerimus adstringi, fluida condensari, ob eamque rationem in corpore pinguedinem, quae alias egrediretur, detineri, rem satis explicasse opinabimur. Verum, quum ex eadem pariter causa imminuat insensibilis perspiratio, et sudor cohibeatur, atque Naturae solertis opera per aliam viam patentiorum, exempli gratia, per organa utroque utriusque materiae eliminatur, nimirum simplex cuiquam videbitur allata ratio. Aliam igitur ad constantis adeo phaenomeni dilucidationem ipsi addamus, oportet.

§. 23. Hyverno tempore corpora et magis esuriunt, et magis comedunt, et magis comedere ex blisporatis, et Celsi sententia debent (ff. Hicopoc. I. Lib. I. itaque largius assumunt, et praesertim succulentioribus (hocq[ue] shoris. 15. enim tempore Carnibus potius, quam oleivibus vescimur), major Cels. Lib. I. fiat succorum humano corpori homogeneorum proventus, necessum est. Deinde, quod praetereundum non est, et ad rem nostram maximè facit, ubi succi adsunt debito abundantiores, solidorum vis reagendi facile superatur a redundantium fluidorum actione, et hinc oritur fluidorum motus retardatio, quae saepe causam praebet majori adipis collectioni, siquidem oleosus humor e maioris facilius separatur quiete, aut saltem immixta arteriolarum hunc deponentium agitatione. Ipse nimirum id in arteriis fieri conajro, quod pinguedinis secretio nem, quod de alcohole, de vino rubro, deque oleo in vase vitreo cylindrico parum amplae diametri simul inclusis accidere videmus. Isti namque diversae indolis liquores, donec quiescent, diversam poro diversa specifica sui gravitate occupant in cylindrico regionem; si aliquandiu agitentur, et concutiantur, confusa adeo subiguntur, atque inter se miscentur, ut alterum ab altero distinguere vix liceat, sibi denovo relictis, priorem locum constantem petunt, et rectè dimetiuntur.

S. 24. Ne hæc, amabo, temere dicta unquam videantur, quandoquidem homines obestati semel obnoxios, in quibus vasa, oleoso fluido nimis malaxata (S. 17), et a cellulis adipis secretioribus ubicunque pressa sanguinis motum sinunt retardari, semper obnoxios evadere quotidiana nos docet experientia. Senes etiam plerosque, in quibus functiones omnes, animales, vitales, et naturales declinationem assiduam patiuntur, eam, quam antea non potuerunt, adipisci videmus obestatem. Et præterea capillares arteriola, adiposos folliculos ruberantes, sive propter magnam a corde distantiam, sive propter multiplices, quas passa fuerunt divisiones, propter curvaturas, amplexus, angulos, et propter nimiam laxantis fluidi viciniam imbecille naturaliter donantur reagendi vi, et nihilominus minus suum indesinenter præstant. Unde magis magisque perspicuum fit: tarditatem motus sanguinis adipis secretionem promovere, atque adeo adipis ejusdem collectionem, cæteris paribus, esse in ratione inversa velocitatis, qua sanguis propria vasa percurrit.

S. 25. Mirandum idcirco neutiquam est, si a diuturniore somno, ac vitâ otiosa adipis incrementum pariter promoveri observamus (S. 18.), quum in corporibus somno, et otio indulgentibus pulsus tardus, et vix plerumque deprehendatur, quod procul dubio et ab inactione solidarum partium, voluntatis imperio subjectarum, quæ dum agunt, fluidorum motum adaugent, dum otiantur, retardari patiuntur: et a particularum, quæ perspiratione debuissent eliminari, minus opportuna retentione, quandam platura speciem inferente, potest mutuo pendere. Cæque verò dictarum rerum effectus hic se recte putandum est: alii enim adhuc se se nobis offerunt examinandos, quorum animadversione adipis collectionem non semper positivè, sed negativè interdum fieri percipiemus.

S. 26. Positiva adipis congestio mihi est, quæ ex copiosè admodum in organum huius colligendæ destinatum, affluente oleosa materia producit: negativa verò, quæ potius oritur ab aliquali oleosa substantia in propriis cellulis vel ubicunque extra vasa sanguinea stagnatione, et lentescentiâ. Illa citra ullum sanitatis periculum diu suspensatur, hæc neque periculo caret, neque secundum naturam est, ac, ut ex sequentibus constabit, vel universalis est, vel particularis. Ad rem veniamus.

§. 27. Imminutis universæ solidorum robove, elasticitate, actione et oscillationibus vel desidiæ perpetuæ causâ, vel propter plerorū hinc (§. 25.) et aliunde (§. 23.), frigidâ præsertim existente atmosphærâ (§. 22.), oriundam; immixtioneque ab invicem fluidorum motu (§. 23. 25.), naturalis calor devescat, necesse est. Ut deficiat calor gradus, qui ad rarefaciendam pinguedinem exigitur (§. 20.), ista non modo, ubi deposita fuit, citius permanere, verum etiam tenuiores sui particulas sensim dimitteudo, crassitiem acquirit, et consistentiam, et tunc ipsa est sibi mot-ipsi impediemento, quominus promptè a folliculis exire (§. 17.), quaquaversum diffundi, partes inutiles factas rejicere, ac reliqua portione a venis (§. 14.) absorberi queat. Quæ res si pinguedini simpliciter contingat, dum adhuc in principali suo organo continetur, nihil extemplo efficere præter obritatem potest: si autem ipsi eveniat, quando per aliena organa (§. 11. 17.) iam vagatur, morbi initium est.

§. 28. Tale vero, quoties adest universalis plerora, pinguedinæ debet reapse accidere, siquidem, nihil obstantibus membranis, adiposos folliculos efformantibus, inertia, et caloris, motusque mutuo decremento, ob successivè advenientis pinguedinis impultum, ut superior (§. 17.) monuimus, aliqua semper portio illius, quæ jam cellulas occupat, egredi debeat; cui profecto non patebit in venas aditus, quum istæ sint satis superque sanguine turgentes, quæve hæc illac lentè vagando, fluidioribus tandem orbata particulis, quiescet, acrimoniam acquirat, emissior quoddam folliculos obstruat, solida quæque laxabit, nervosas partes afficiet, tumefaciet membranas, aliosque sexcentos effectus contra animalem œconomiam exercere conabitur.

§. 29. Ex iis omnibus, quæ huc usque de pinguedine prædicavimus, brevem hanc, quæ memoriæ aptius adhæreat, conservare licet anacephalæosin. Adipis excretio (liceat mihi excretionis nomen uti ad designandum ejus e cellulis exitum) adipis, inquam, excretio, ut res naturaliter, et bene se se habeat, fieri quidem debet in ratione reciproca secretionis, et hæc iterum, cæteris paribus, in maiora excretionis ratione (§. 17.); at, quum secretio fiat in ratione composita ex directâ ipsius in sanguine abundantia (§. 19. 21. 22. 23.), et inversâ velocitatis motus, quo sanguis per sua vasa progreditur (§. 23. 24. 25.); excretio vero fiat in ratione directâ caloris, et motus (§. 18. 20.), quorum alter adipem rarefacit, dissipat, exhaurit, alter



agis obstat collectioni; patet, quando aqua major fit adipis secretio, ipsius excretionem aqua fieri proportionem haudquaquam posse. Igitur pinguedinis congestio erit in ratione composita ex secretionis directae, et inversae excretionis.

§. 30. Deinde, quum excretionis nomine non solum adipis a suis cellulis exitus, sed ipsius pariter a vaporatio, aut in venas reditus comprehendantur, quumque haec duo, praesente plenitudine, vel porum obstructione nullatenus obtineant: evidens est excretionem fieri in ratione inversa plenitudinis vasorum vasamentorum, et exhalantium tubulorum, seu meatuum oppilationis, ac proinde de hoc de causis contingere, ut oleosa substantia de suis vasis ostaculis ejecta, diu extra venas pervagetur, iis adhaereat partibus, quas vix attingere debet, et alicubi demum, aut universae praeternaturalem formet congestionem.

§. 31. Animadvertendum insuper est, quod aliquando pinguedini particulatum conspicias naturaliter adiungitur, tunc autem ob rationes nuper allatas facilius adhaeret solidis partibus, in eisque immoratur. Chedicae quidam Clariss. Professor, Historiae naturalis, et Naturae peritissimus, dum simul de pinguedinis usu quondam disputavimus, sedulo mihi enarravit, Ceturices nunquam tam bene, tamque cito impinguari, quam quum ipsis potus omnino subtrahitur. Si hoc est, quisque videt in illis sanguinis motum, quod non sit sufficienter dilutus, torpescere, pervaporationem imminui, et in corpora pinguedinem detineri, et coaccervari, quatenus fluida satis non est, quo inde quaeat abire.

§. 32. Praemissa haec theoria faciliam, et perspicuam nobis exhibet quorundam phenomenorum in corporibus vitam sedentariam agentibus, aut alicuius necessariae evacuationis suppressionum patientibus, vel melancholica constitutione praeditis, vel aetate provectis, congerentium explanationem. Primum scilicet intelligitur: Cur homines nonnulli, solitudinem exacte servantes, postquam obesos (§. 25.) facti sunt, universali virium prostratione, languore, tristitia, ignorantia laborent, mortuisque interdum fiant concolores, pinguedine bonum solum ordinem perturbante (§. 26.). Cur Virgines Monasterio perpetuo clausae, aut quacunque de causa solitaria, et parum exercitatae, clonari corripiscantur, viribus, et appetitu langucant, nauseam diu evocentur, bonos cibos fastidiant, latices, carbonem, calcem, et alia absorbentia appetant, toto saepe turgant corpore, ita ut vel cadematosa, vel obesiores

potissimum in partibus inferioribus, et circa mammas appareant, et rosarum faciei colorem, cutisque universa candorem commutent in pallidum flavescentem colorem adipis proprium, perinde ac evenit ex Syphilide, cujus virus in vitiosa pinguedine creditur latere (§. 11.). Cur generatim sedentarii hæmorrhoidum, aut mensium fluxus suppressi (§. 25.), quo una cum humorum redundantia heterogenea noxia exulant particule, et iterum cum hoc intercapto, multifariam aggraviatus morbus. Cur in melancholicis, quorum humores sunt universè crassi, densi, lenti, cinaces, tam frequenter appareant viscerum abdominalium infarctus, hypochondriorum, et glandularum universè obstructions (§. 12. 30. 31.). Cur denique Senes in quodam soleant incidere morbos, quibus ferè expers est vegetior ætas. Intelligitur, inquam, ut omnia uno verbo complectar, pinguedinem in hisce subjectis omnibus eo posse Naturæ leges transgredi, ut ex illa ortum ducant pleraque ex iis infirmitatibus, quæ eisdem sunt maximè familiares. Atqui sedentarii, plethorici, melancholici, et senes præ cæteris Cancro verantur. Quousque igitur veram Canceri causam proximam in adipe vitiosa versari non fatebimur?

§. 33. Ut tandem ab universalibus ad particularia descendamus, quo unica præpositionis meæ veritas magis, et magis niteat, hæc adhuc veniunt consideranda. Congestio adipis morbosa, quam in universo corpore fieri posse obiter diximus (§. 26.), et qua ratione fiat, breviter ostendimus (§. 26.), eo facilius in aliqua corporis parte formatur, ubi plethora sit magis manifesta. Hoc autem dico, ut pateat ratio, cur mulieres, menstrui fluxus suppressionem passæ, Cancrum mammis recipiant. Chlagnum, quod mammas et uterum commercium interest, manifestant cum earum inflatio, imminente mensium eruptione, tum ipsorum cessatio lactationis tempore, tum mammarum flacciditas post magnas uteri evacuationes. Unde patet plethoram a mensium suppressione apparentius fieri in mammis, et inde largior pinguedinis secretio (§. 23. 34.), aut saltem paucior ejus excretio (§. 26.) in ipsis congestionem afferent (§. 29. 30.). Ad hujusce rei exemplum observationem præferam, quam in tractatu quodam meo inedito, *De ossibus præter naturam tumulentibus, et curvis* inscripto, exaravi.

§. 34. Dum avidè prænderet Senex quidam octagenarius obesa constitutionis, qui in Sancti Joannis Nosodochio janitoris vices gerebat, cuive olim, nescioqua causa, crus amputatum fuit, vitâ decessit.



Istius abdomen, et pectus, Medico rogante subitanea mortis causam investigaturo, aperui; quo facto, obtruncatorum curvis ossium cicatrices inviseri desiderio tactus, partes molles circumjacentes anatomico cultro absculi. Inter hoc faciendum, vidi quodam ictu salpelli os alterum obliquè resecui, atque fortuita incisione ista molliorem ossa nata fuisse edoctus, illa serio examini subjeci. Mutuae portiones tibiae, et fibulae eo molles ubique erant, ut nulla vi cultro discinderentur. externè earum substantia immutata oculis apparebat; interius vero omnes cancelli, cellulae, columnae, et fulcimenta evanuerant, ut amplum reliquerint conservata medulla spatium. Exemplum dixi, nam duo haec ossa diametrum habebant illà duplo majorem, quae integris alterius curvis ossibus erat. Eodem modo constitutum reperi femur, cujus substantia exterior neque durior, neque crassior erat recenti mali punici cortice, cujusve interior cavitas, septimentis, fulvisque cavum, maximam includebat medullae columnam. Ex observatione ista, aliis neglectis illationibus, hoc tantummodo arguam: quod nempe sanguis, qui determinatà corpora huc ferebatur, membro integro existente, non potuerit aliò detorqueri, ut a mutilatis partibus plerumque removeret. Hoc admisso, reliqua intelliguntur, praesertim cum addideris, quod propter minorem membri illius motum, parvum consumebatur olei medullaris (§. 20. 23. 25. 30.).

§. 35. Praeterea pinguedo, quae stagnando vitium aliquod, veluti crassitiem, tenacitatem &c. suscepit, si ad circuitum restitueretur, neque tamen susceptam vitii notam deponat, gignendo Cancro apta erit, qui corporis partem quamcumque ex iis, quas supra memoravimus (§. 12.), indiscriminatim aggredietur. Idcirco in melancholicis non ablata humorum crassitie, et tenacitate, Cancer dominatur; Viget Cancer in iis, qui leguminibus, carne salita, fumoque indurata, aliisque siccis vescuntur dapibus, quod haec agant in pinguedinem (§. 31.), et melancholicum temperamentum faciant. In senibus autem ex paulatino vitiatà pinguedine manifestatur tandem virus Cancerosum vel diversè in sana, et integra parte, vel in verruca, aut tuberculo jam diu sine molestia gestatis.

§. 36. Hisce omnibus ita enunciatis, reliquum est, ut modò tandem deveniamus ad comparandos peculiares adipis effectus cum cancri phaenomenis. Quod antequam facio, sequentem

juvat historiam praemittere, ex qua plura fas erit conicere, quae sola ut ut eloquens theoria nunquam potest satis confirmare. Mulier sexagenaria, obeso habitu, ac temperamento sanguineo-melancholico praedita, a quinquagesimo circiter aetatis suae anno, quo ipsi menses substiterunt, scirrhum ovum columbinum mole aequantem, inter cubitum et dextram manum gestabat. Morbi huius pertosa, quod manus liberum exercitium impediret, quorundam chirurgorum consilio illum filo serico circumligavit, pressavitque, ut a parte sana dimoveretur, atque decideret. Dolorem, quo antea experta fuerat, toto illo tempore, quo vinculum sustulit, eximium experta est, ita ut duodecim elapsis diebus, quum tumor in basi circumvolutus iam fuerat, vinculum solvere coacta fuerit.

S. 37. Posthaec emplastris atrahentibus, ac suppuratoriis unguentis partem alternatim obducebat, tumoremque in dies cum dolore punctorio augescere experiebatur. Tandem levamen aliunde desperans, Taurinum petiit, quo ad S. Joannem Hierosolymitanum confluxerit. Hic Canceri luxuriantis saevitibus igne identidem obtundebatur, decidebat eschara, filis carpsis modo siccis, modo antiseptico aliquo imbutis tegebatur ulcus, usquequo duos post menses aspectu sed solida cicatrice aegra pars fuit obducta.

S. 38. Ad patriam suam aequo animo rediit tunc vetula, sed octodecim postelapsis mensibus, in cicatricis loco ulcus aperiri, et monticulum elevari sensit, comitante dolore punctorio. Plurimis modo inartibus, modo perniciosius remediis quinque mensium spatio ad sui medelam usa est, quibus exiensibus eo iterum confugit, ubi inconstantem receperat curationem. Ulcus inaequale, et asperum erat, ad summum foetens, sanis, et sanguine scatens, in peripheria inflammatus, et livescens, atque ad tres transversos digitos prominerebat. Vena varicosa, integumenta ad antebrachii medietatem usque tumida, et dura. Membri amputatio necessaria praedicabatur, sed quod illam aegro animo ferret infirma, operationem deferre, et pluribus in casum uti per menses aliquot auxiliis oportuit. Quando postremo, aegro permittente, antebrachium ad aliquam brachii distantiam resectum fuit.

S. 39. Tumoris statum sedulo examinatus, integumenta prorsum scindi, et funiculum quendam turgidum, nodosum, alibi durum, flaccidum alibi observari, qui ab osse resecto ad canceri basin perveniebat, et cum ipso confundebatur, quemvis distinguere



vix licuit utrum nervus, an tendo esset. Hunc juxta fibrarum longitudinem bifariam divisi, atque ipsum interpolatè nigrescere, aut livescere, hic spongiosum, illic compactum esse conspiciebam. Colores istos etiam in tumore observavi, qui tamen alicubi flavus, aut rubellus apparebat. Os subjecta aliquantulum erosa, et nigerrima erat. Linguedinea vero membrana quibusdam in locis infarcta dura, et fulva erat, et alibi foveas, sulcos, et sinus habebat præternaturales, qui ad cancrum usque extendebantur.

§. 40. Post amputationem omnia secundum Artem administrabantur, sed vix post quatuor menses inducta fuit cicatrix. Quin immo, dum pars mutila ad consolidationem accedebat totum brachium inaequaliter turgescere, et axillares glandulas augeri, ac dolere coeperant, quousque tandem ista ulcerata fuerunt, circumposita integumenta insigni nigrore suffusa, et omnia uno verbo Cancro symptomata hic summo peraecece videntur, quae post sex menses generosam infirmam e medio sustulere.

§. 41. Quae ex hac historia referri possint consequentiae, passim monebo, dum Cancro phaenomena a vitiosa pinguedine oriri singillatim more demonstravero. Esto igitur a Cancro ortu ipsius historiae initium.

Si vasamentum vasculorum plenitudo, vel obstructio (§. 28. 33. 34.) aut emissariorum obstructio meatuum (§. 30.), aut vicissim particularum crassities, et densitas (§. 31. 35.) adipis excretioni obstiterint, haec ibi non raro coegetur permanere, quod vel immediatè a sanguineis arteriis, vel esuis folliculis appulit, ibique congestionem formare (§. 27. 28.), quae a nova accedente pinguedine, quam successivè removabitur, paulatim incrementum suscipiat. Hujusmodi congestio praeternaturalis, sive fiat in glandularum tunica cellulosa, sive in cystarum venterculo, et emunctorio, sive in cellulis, amphiactibusque visceris cujusquam, vel est ex initio Cancer, si materia crassitiei accedat peculiaris acrimonia; aut haec nullo pacto manifestatur, et, quoad materia acrimoniam non fuerit adeptam Scirrhum tantummodo efformabit. Sed, quum de Cancro speciatim, non vero de Scirrho sermo sit, hunc silentio brevitate causa praeterire, et illum in aliqua ex iis glandulis, quae in corporis superficie locantur, ad nitidiorum phaenomenorum enucleationem considerare satius erit.

§. 42. Orta igitur hac lentescentis pinguedinis congestione,

Dum ejus fluidiores particulae minutulos quosque porulos permeando evolabunt, crassiores tenacissimae adhaerebunt partibus, glandularum componentibus, et proinde glandulae, quae antea ob ingentem membrana nervis, arteriis, et venis interposita cellularum numerum et propter membrana haec omnia simul cingentis, laxitatem mollesculenta erat, aut vix tactu distinguebatur, intumescet, fiet durior, et inaequalior, quia in ipsa cellulae, et intercapitulae alicubi post alia occupantur, atque distendantur a lentescencia, ac tenaci materia. Hoc est Canceri initium, in quo propter stagnationem, quam a stagnatione sortitus adeps, pars incipit dolere perinde, ac si nervi lanceola pungerentur; sed cutis naturalem adhuc retinet colorem usqueque ad malignitatis culmen profecta cancerosa materia, aegram partem omnimode pervertat, atque deturpet.

S. 43. Verum enim vero, quo magis ad axillam progreditur Cancer, eo deterior evadit glandulae constitutio. Nam, quemadmodum in ossibus carie laborantibus medullae oleum corruptum dum eorum lamellas dissipat, corroditque, nigrore etiam deturpat, quod insignem ejus ostendit acrimoniam, et nigrum colorem: non aliter pinguedo omnis, in cancro remota, post diuturnam stagnationem magis magisque corruptitur, vancorum ranciscentis acerrimum, et dum ejus pars fluidior membranas, nervos, et vasorum tunicas penetrat, dividit, ac tumefacit, pars reliqua maximae tenax, atra, et picea (perinde ac Veterum ^(g) Compess. Chirurg. Tab. Ia. atrabilis adusta) in interstitiis relinquitur. Unde dolor in Cancro nigror, major asperitas, et aucta durities.

S. 44. Quod autem dolor interdum quiescat (sicuti Junckerus ^(g) monuit), hoc provenit vel a nervi compressi stupore, vel ex eo, quod nova minus morbosa superveniens pinguedo alterius acrimoniam aliquandiu obvolvatur, occultetque. Ex quo ratio percipitur, cur Cancer licet invaseans, per annos aliquot occultus quandoque maneat, et deinde rursus recidescat, quum ejus materia insuperabilem acrimoniam acquisierit. Dolorem istum sub vesperam, noctisque vigere incidenter diximus [S. 13.]: Occidente enim sole, atmosphaera propter sublatae aeris rarefactionem, et propterea quod aer plures contineat vapores, halitusque a solis radiis interdum elevatos, in terrestria corpora insigniter gravitat, animalium perspirationes vapente immixcit, fibras quodammodo spasmodice afficit, atque exultatas fluidiores, acrioresque adipis particulas in Cancro remoratur. Noctu vero lecti calore



tumultuariae actae humoris corrupti particula, dolorem necessario augere debent, quoniam majori vi in sentientes partes adiguntur. S. 45. Etiam si cancrum conchya sanies agrotantis glandulae membranas, nervos, et vasa continuo discindat, nihil tamen minus in Cancro eam nunquam sentimus fluctuationem, quae in abscessibus constanter adest, neque ullam partis mollescentiam; quoniam abscessuum partium extremitates statim ichore imbuuntur, tumescunt, et spatium occupant, quod propter fibrarum vim centripetam, seu contractilem vacuum alioquin reliquissent. Morboz, ac enormis ligamentorum, membranarum, tendinum &c. excrecentia quando ipsis subjacet ossis caries, aut ipsis oleosa inspissantes applicamus, talem esse pinguedinis proprietatem luculenter probant. Quod si exemplum requiritur ex aliquo peculiari Cancro petitur, in promptu est id, quod in praedicto Xenodochio observari, dum adstantibus Praxeo, Chedica Clariss. Professore, et plerisque Chedicae studiosis, mulieris quadraginta annorum cadaver incidere, quae initio medico lethalem Cancrum habuerat. Thoracis, et ventris visceribus in hac inspectis, examinanda restabant genitalia organa, de quorum intolerabili ardore saepius conquerebatur mulier illa, dum febris lenta ad mortem ducebatur. Uterus visui incolumis apparuit; Vagina autem in parte anteriori a trium pollicum subter uterum distantia usque ad meatum urinarium tota exesa erat cum sibi annexa vesica. amba simul crassitudine pollicis aequalem efficiebant, summo inficiebantur nigro, atque pestiferum foetorem emittebant. Superstes vesicae portio odore, colore, et crassitudine eisdem donabatur, atque interna ejus tunica villi eo excreverant, ut Virginis vaginae asperitates, et prominentias omnino referrent.

S. 46. Propter tantum partium glandularum componentium augmentum vasa ampliores, siquae adsunt, ipsam subeuntes, aut circumambiantes comprimuntur, varicosae, et a sanguine in ipsis coarcto livida apparent, atque diversimode affici periclitantur. Interim autem plures alios exerit effectus virus cancerosum, quod ex porculis, et erosionibus involucri scatur, partim adjacentes venas bibulas ingreditur, et circulares inficit humores; partim musculationum intervalla percurrit; nervorum tunicas, tendinumque vaginas percipit, penetrat, spongiosas reddit, nigro inficit colore [S. 39.] atque exinde dolores longe a tumore cautos, vicinis glandulis malum communicat, longinquis minatur, atque portendit; omnem pinguedinem in itinere sibi occurrentem, in similes trahit corruptelas; foveas, sinus in membranas

pinguedinea excavat, hanc duram reddit, et ita dispositam, ut omnis huc
 perveniens pinguedo in illa condensetur, subideat, et illam gignat (§. 38.)
 inflationem, quam oedematosam nominat Junckerus. Quibus de rebus,
 licet a labia humorum massae tradita, Cancer deinceps propter diversas
 partes indiscriminatum grassari, siquidem ejusdem labis particeps
 sit vel ipsum medullare oleum (§. 13.); in regione tamen primam
 obassa facilius grassatur. Quae enim pinguedo tanax, aeris, et verru-
 rosa nervis, tendinibus, membranis &c, aut cuiusquam glandulae inheret,
 ibi pro fermento stat perpetuo, neque ab ullo unquam superveniente
 naturali humore dissolvatur. Exemplo sit maxima difficultas, quam
 experimuntur Pictores, dum colorum materiam jampridem oleo suba-
 ctam, deinde libero aeri relictam, deinde nubigera conantur: vix ete-
 nim, aut ne vix quidem illam penicillo, ut antea, obtemperantem
 et ductilem reddere possunt nova olei additione, atque penicillo vi,
 et diu supra marmoreum planum circumducto. Tamen pertinax, et
 valida evadit pinguium liquorum tenacitas: Quodsi ad ipsius loco sales
 adessent, quos dubitat, quin longo post tempore ab accidentibus humo-
 ribus dissolvi, et abripi, alio transferri, aut de corpore expelli possint?
 In hocce casu, tamen in corpore permanserint, nullum auxilium
 illis jus erit Cancerum in eadem regione rursus gignendi, unde semel
 inviti abierunt, adeoque nos ratio lateat, quia Cancer in labro cu-
 feriori sanatus, tribus post annis in faucibus resurrexit, scribente (h) Observat.
 Petro de Chavachetis (h), aut ex brachio, ex mamma, ex crura ablatum, Medico-Chirurg.
 in inguine, aut sub axilla ejusdem lateris testante Experientia, Sylloge
 suboritur, at symptomata portendat pejora prioribus. Observ. XXIX.

§. 47. Denique pinguedinis congeries, quae glandulam inter, et cu-
 tem posita est, canerosae saniei consociatur, ipsius auxilio cutem
 exedit, et tumorem in ulcus convertit, cujus labra elevantur, retro-
 vertuntur, a centro assidue recedunt, et secundum peripheriam
 extenduntur. Pinguedo, quae aeris contactum nunc patitur, in de-
 terius protecto abit, veluti ossa demdata aeri exposita livescere, aut
 nigrescere cernimus. Ob hanc causam (opinor) tubercula quoque
 scirrosa, quorum materies pinguedo est (§. 41.), postquam vinculo (§. 36.),
 causticis, aut aliter irritata, et excoriata fuerit, caneroso curante
 insigniuntur. Cancer itaque, ut memoria prodidit Lazarus Riverius (i),
 supra Ventrulae cujusdam Zygoma, ex quo cornu decidebat, eratus, pin-
 quedini videtur originem suam debere, quae dudum sub cornu sta- (i) Observat.
 gnavebat, et aeri deinde permixta, salvandi nata est occasio. communis.
 Ego quidem in melancholico septuaginta circiter annorum sene
 annosam verrucam, rasorio cultero excisam, canerosam induisse
 naturam vidi, quae carnem ossi zygomatico superpositam, et postpe-
 bram inferiorem male affectis usque ad aevi obitum. Porum autem



in medio nasi globulo, seu apice situm, unguibus consulto, crebroque avulsum in Cancrum exaruisse in muliere propectae aetatis — observari, qui diuturnis temporis stadiis aut siccus, aut foetida scaturis sanie alternativè apparebat.

S. 48. In cancrosa plaga, quod nullus amplius obex opponatur, luxuriantur fibrae, atque omnes simul, aliae magis, aliae minius evascentes, monticulum durum, et asperum constituunt (S. 34). Humores omnes cum pinguedine huc confluentes convulsuntur, et cada- vericam emittunt magnitudinem. Istorum, seu potius adipis corrupti vi corrodente fungosa fibrarum extremitates abraduntur, liquefiunt, et una cum sanie diffundunt: unde vasa, et arteriola tunc hiantes sanguinem fundunt, donec eorum extremitates denuo tumefacta occludantur ita, ut nihil nisi humorem tenuem transmittant. Nervuli autem glandulam majori copia aduntes, quam ceteros ejusdem magnitudinis partes, vel solo aeris contactu dolorem suscipiunt, necum manus, aut alius cujuslibet rei accessione. Neque eorum sensibilitati obstat, quod diximus eorundem tunicarum a cancroso humore tumefieri, siquidem neque omnes nervorum subculi hoc modo afficiuntur, atque anatomicorum industria microscopiorum ope tot in minimulo quoque nervulo detexit filamenta, ut, eorum pleraque integra permanere liceat conjectari. Quod ad livorem, aut nigritiem attinet, quae prae labra cutem non raro deturpant (S. 36), ea ex coarcto sanguine produci quidem videntur, sed quoniam hic aliter, quam in Ecchymosi, res est, et quoniam agra imaginari possumus hujusmodi sanguinem ad quolibet cutis puncta corrivari, addere praestat, quod humor Cancrosus per cutem serpens, hic nigras, crassioresque relinquit moleculas, hisque expeditus serpere prosequitur, ut irritatione sua globulos sanguineos in vasa lymphatica ingredi cogat, quod erysipelatousam procreat inflammationem. Alia insuper, quae Cancrum concomitantur universalis symptomata, febrem, scilicet lypothymias, syncopes, delirium, nauseam &c, partim a dolore, partim a circulante cancroso materia proficisci fatebitur, quisquis laridi, aut olei enjussiam varicorem fauces excoriantem et os aspero, et fastidioso amaro obnoctem exspectus fuerit.

S. 49. Quae cum ita se habeant, ac nostra maxima interit, Nosse quid in rebus Natura creavit ad Artem maxime curandum est, ut, quod antisepticum pro Cancrum curatione inventum iri sperat Clariss. Pringle, illud ab iis rebus petatur, quae adipis tenacitatem solvere, acrimoniam obnueve, et putrilagineam profligare Valeant. Camphoram haec forsitan omnia praestare posse, cum ipsius Aromatica in oleis,

tum ejus cum oleis miscibilitas, tum vis, qua pollet, antiseptica illa tercenties major (ut nuper laudati Cluitoris adsternunt Experimenta), qua sal marinus donatur, vehementer suadent, sed ad hoc confirmandum etiam experientia desideratur. Cæterum, Camphoram tamquam hæmenagogum cæcis mensibus, et erysipelati quoque curando, cujus causam proximam esse pinguedinem corruptam probat Horterus (K), egregie inservire nemo inficiabitur.

Videant ergo, velim, Chirurgi Profectores, quid in Cancro curatione præstare possit hoc antisepticum. Illius parva dosis ore sumenda identidem præscribatur, atque externè simul adhibeatur, ejus rasura Cancrum aspergendo, si apertus fuerit: aut, si adhuc latens, exalefacta farina triticea commisceatur camphora, addito salis communis pusillo, quæ sacculo inclusa aliquoties in diu parti applicentur. Huic camphoræ externè utendi modo Erysipelas pertinacissimum viginti quatuor horarum spatio cessasse vidi in obesa muliere, cujus morbum Chirurgus quidam Germanus curandum suscepit, posteaquam septem diebus ipsum ineptè tractaverant minoris doctrinæ alii chirurgi. Quod experimentum paullo post in robusto viro reiteratum, eventum sortitum est a priori non dissimilem.

Est non dissimulabo tamen, quod in ambabus hisce curationibus Camphoram violentè egisse docti, nam, quæ proportionè evanescebat inflammatio, in ejus medio surgebat tuberculum, augebatur, et mox dehiscens, saponaceum effundebat liquorem, qui condensatus crustam efficiebat, non nisi post dies circiter octo deciduam.

Nequid simile in Cancro eveniat, et agrotantem lædat, Camphoræ usui præmittendum censeo decoctum guaiaci, cujus resina balsamica pinguedini consociabitur, ejusque acrimoniam emendabit, aromatica vero indoles tenacitatem solvet, diaphoresin, ac diuresin excitabit. Quanti emolumenti sit larga hujus decocti portio in Cancro Therapeja, sequens patefaciet historia.

§. 50. Speciosa quædam puella, quæ ab illo, quo sororiarî cœperat tempore, tumidulas mammas acri noxæ, at audaci Amantium manus contrectationi frequenter exponere, in earum altera Cancrum admisit, ac tribus mensibus tacita gestavit. Exeunte mense Decembri superioris anni, hoc ab ipsa rescivi, multaque percontatus, sequentiâ intellexi: ipsam, videlicet, quatuor abhinc menses lunari fluxu caruisse, postquam animi angore, et tristitiâ quod amatum sibi carissimum amisisset, percussa fuit. paullo post clorosi correptam fuisse, et glandulæ tumefactione in mamma, quæ post mensem unum caput dolere. Mammam contrectari, ac tumorem mediocrem, durum, et asperum, qui ex pluribus glandulis

(K) Cit. Oys.
Lib. X. Cap. V.



mutuo lateraliter junctis constare videbatur, distincte sensi, ubi pro
vero cancri simbolo divus punctorius dolor misellam audacter tor-
quebat a mammae basi usque ad prominulam papillam. Quum
audissem, ipsi propter capitis dolorem impede venam paullo ante
sectam fuisse, nihil amplius faciendum praescripsi, quam ut sin-
gulis diebus artus inferiores frictionibus exerceret, decoctum guaiaci
largis, crebrisque haustibus potaret, eodem saepius foveret mam-
mam, ac cibos acidos, duros, crassos, et pingues evitaret. Huic me-
thodo constanter obtemperabat puella, etsi initio malum exa-
cerbari videretur, ego enim opinionis mea tenax, ipsi animum
addebam. Post decimam quartam a curationis initio diem dolor
quiescere, ac tumor amolliiri cepit, post mensem unum in-
signem praeseferebat decrementum, quindecim adhuc post diebus
menses copiosi eruparunt, et exiunte secundo curationis -
mense mamma naturaliter constituta, et pristinus faciei co-
lor apparuit, neque ullo amplius, quod sciam, simili morbo
aggravari cessavit puella.

Proh! Quam bene hujus remedii efficacia ex eventu isto manifestatur!
Quid ergo non efficiet, quando ipsi addatur exieraticus camphorae usus?

Fateor quidem praedicta curationi non parum contulisse men-
siam eruptionem, juxta Hippocratis monitum, dicentis: Cancrum
nonnum ad summam saevitiem profectum sanescere, si menses
solvantur (1). Nequa diffiteor, eodem tempore, quo proposita va-
media administrabuntur, manum etiam chirurgicam necessa-
riam perscepe futuram, si pars cancro laborans insigniter de-
turpata fuerit, ac profunde corrupta. Sed eo efficacem esse
judico propositam methodum, ut vel chirurgiae removeat ne-
cessitatem, vel post operationem chirurgicam recidiva periculum
auferat. In casibus vero difficilioribus, ubi ne ipsa quidem ampu-
tatio locum obtineat verosimile est, quod si morbum radicem
curare expositis subsidiis non licebit.

„ requiem tamen indere morbo
„ Fas erit, et tristem saltem muliere dolorem.

Finis.

(1) V. Lib. II.
De morb. mulier.

No. 17.

Presenté le 14. 9^{te}. 1757.

m. Scotte commissaire, pour le
traduire et en faire son rapport
